

Obvestila za varstvo pri pridelavi oljk z dne 24. april 2023

OBVESTILO O VARSTVU OLJK

Pavje oko in oljkova siva pegavost

Zaradi padavin in ugodnih temperatur v preteklih tednih opažamo povečan pojav bolezenskih znamenj **pavjega očesa**. V kolikor še niste, priporočamo, da za prvo škropljenje uporabite registrirane pripravke na osnovi **bakra**. Če ste z omenjenimi pripravki že škropili, lahko za drugo škropljenje proti pavjemu očesu izberete registrirano sredstvo na osnovi dodina.

Za zatiranje bolezni so registrirani naslednji pripravki:

AKTIVNA SNOV	FFS	ODMEREK
- bakrov oksiklorid	Cuprablau-Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
- bakrov oksiklorid	Cuprablau-Z 35 WP	2 kg/ha
- bakrov oksiklorid	Cuprablau-Z 50 WP	1,4 kg/ha
- bakrov oksid	Nordox 75 WG	1,25 kg/ha
- dodin	Syllit 400 SC	2,25l/ha
- tebukonazol + trifloksistrobin	Nativo 75 WG	0,25 kg/ha
- difenkonazol	Score 250 EC	0,5 l/ha
- <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Serenade ASO	8 l/ha
- <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Taegro	0,185 do 0,37 kg/ha

Pri ekološki pridelavi oljk je dovoljena uporaba pripravkov na osnovi bakra in sredstva na osnovi mikroorganizmov - *Bacillus amyloliquefaciens*. Značilna bolezenska znamenja pavjega očesa so okrogle sive pege na listih in močno odpadanje listov v spodnjem delu krošnje. Na bolezen sta posebno občutljivi zlasti Istrska belica in Oblica.

Glavni znaki **oljkove sive pegavosti** so blaga sajavost na spodnji strani in rumenenje zgornje strani lista. Na bolezen so posebno občutljive italijanske sorte (Leccino, Leccione in Pendolino). Pripravki na osnovi bakra delujejo proti obema boleznima, sočasno razkužijo rane nastale ob rezi ter ovirajo razvoj bakterioze, povzročiteljice oljkovega raka (*Pseudomonas savastanoi*).

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!