

Obvestila za varstvo pri pridelavi oljk z dne 29. junij 2023

OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV

Oljčni molj

Oljkarje obveščamo, da na feromonskih vabah opažamo prisotnost metuljkov plodovega rodu oljčnega molja. Oljke so v trenutni fenofazi (razvojna faza) oljke H oziroma 70-72 BBCH (formiranje plodov).

Samice plodove generacije odlagajo jajčeca na plodiče oljk v območju peclja. Izlegla ličinka se zavrti v še neolesenelo koščico ploda. Poškodovani plodovi pričnejo odpadati z drevesa v prvi polovici septembra. Vrh odpadanja plodov je navadno dosežen sredi septembra, ko oljčni molj pri peclju zapušča koščice oljk. Največ škode oljčni molj naredi na naši najpomembnejši in najštevilčnejše zastopani sorti 'Istrski belici'.

Oljkarjem katerim oljčni molj redno povzroča večji izpad pridelka, lahko sedaj proti plodovemu (karpofagnem) rodu oljčnega molja v sklopu integrirane pridelave uporabijo pripravek na osnovi spinetorama **DELEGATE 250 WG** v odmerku 0,075 kg/ha. Karenca sredstva je 21 dni. Pripravek je nevaren za čebele!

Bodite pozorni na karenci pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Oljčna muha

Sedaj je čas za **namestitev vab za množičen ulov in za ukrepanje z odvračalnimi sredstvi.**

Cilj množičnega ulova je privabljanje oziroma uničenje škodljivca z večjim številom vab. Le te so lahko različnih oblik in delujejo vizualno (rumena barva), prehransko (razne amonijske soli, hidrolizirani proteini...) ter s pomočjo spolnih feromonov. Izdelamo jih lahko tudi sami.

V letošnjem letu sta za zatiranje oljčne muhe registrirani zastrupljeni vabi **FLYPACK DACUS TRAP** in **ECO_TRAP**, ki se lahko uporabljata tudi pri ekološki pridelavi oljk. Prva je v obliki lovne posode druga kot vrečka. Obe vsebujeta aktivno snov deltametrin, prehransko privabilo amonijev bikarbonat in spolni feromon samic.

Vaba **ECO-TRAP** je namenjena za preventivno uporabo v oljčnih nasadih v območjih s srednje intenzivnim pritiskom populacije oljčne muhe (*Bactrocera oleae*), kjer zmanjšuje delež poškodovanih plodov v osnovnem odmerku 100 vab/ha (1 vaba/100 m²). Karenca je zagotovljena z načinom uporabe.

FLYPACK DACUS TRAP - insekticidna vaba je zaprt sistem. Sestavljena je iz dvodelnega deljivega ohišja (posode) iz umetne snovi, feromonskega in prehranskega privabila ter obešala za pripenjanje v krošnjo dreves na zunanosti pokrova. Spodnji del ohišja je rumeno oranžne barve, ki tudi z barvo privablja oljčne muhe, in ima stranske vstopne odprtine za odrasle osebkje ciljnega organizma. Pokrov ohišja je prozoren, na njegovo notranjo stran je nanesen

prozoren insekticid (deltametrin). V nasad oljk se enakomerno porazdeli od 50 do največ 100 vab na hektar, odvisno od pričakovane stopnje napada oljčne muhe. Posamezno vabo lahko uporabljamo tudi za spremljanje pojava oljčne muhe.

Pred uporabo obvezno preberite in dosledno upoštevajte navodila za uporabo.

Kot odvracali za oljčno muho sta letos za uporabo na oljki dovoljena pripravka **Invelop White Protect** na osnovi talka in **Surround WP** na osnovi kaolina, ki sta registrirana kot osnovni snovi za varstvo rastlin. Nanesen na rastline ustvarja fizično oviro, ki ščiti nadzemne dele pred biotičnim stresom povzročenim z napadom škodljivih žuželk (poleg oljčne muhe odvraca tudi marmorirano smrdljivko) in gliv ter abiotičnim stresom povezanim s prekomernim sončnim obsevanjem. Poraba med 25 in 20 kg/ha za eno aplikacijo. Odvracala lahko uporabimo v okviru ekološke pridelave oljk.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

SMS – skupen

Oljkarji

Namestitev vab za množičen ulov in ukrepanje z odvracali - vec o ukrepih

www.kmetijskizavod-ng.si

Pripravil: Matjaž Jančar