

Obvestilo o varstvu oljčnikov z dne 26. julij 2023

Poškodbe zaradi toče in pavje oko

Po obilnih padavinah v kombinaciji z močnim vetrom in točo v nekaterih oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk opazamo poškodovane vejice in plodove oljk. V posameznih oljčnikih opazamo tudi pojav glivične bolezni **pavje oko**.

Oljkarjem, kateri v svojih oljčnikih opazajo poškodbe oziroma pojav bolezni, priporočamo, da prizadete oljčnike poskropijo s fungicidom. V primeru poškodb priporočamo uporabo sredstev na osnovi bakra. V primeri pavjega očesa tudi priprava na osnovi difekonazola.

AKTIVNA SNOV	FFS	ODMEREK
- bakrov oksiklorid	Cuprablau-Z 35 WG	1.6-2 kg/ha
- bakrov oksiklorid	Cuprablau-Z 35 WP	2 kg/ha
- bakrov oksid	Nordox 75 WG	1,25 kg/ha
- difenkonazol	Score 250 EC	0,5 l/ha

Pri ekološki pridelavi oljk je dovoljena le uporaba pripravkov na osnovi bakra.

Glavni znaki pavjega očesa so okrogle sive pege na listih in močno odpadanje listov v spodnjem delu krošnje. Na bolezen sta posebno občutljivi Istrska belica in Oblica.

Bakreni pripravki delujejo tudi proti **oljkovi sivi pegavosti**, sočasno ovirajo razvoj bakterije, povzročiteljice **oljkovega raka** in imajo odvrčalen učinek proti **oljčni muhi**.

Oljčna muha

V posameznih oljčnikih na območju Slovenske Istre na feromonskih vabah opazamo nekoliko povečano prisotnost oljčne muhe. Tudi pri pregledu vzorčenih plodov na posameznih lokacijah opazamo manjšo poškodovanost plodov in sicer predvsem z jajčeci in ličinkami L1 stadija. Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih in poškodbah na plodovih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/

Oljkarjem na območjih kjer se je muha številčneje pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden), **priporočamo ukrepanje z zastrupljeno vabo** po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek **GF 120** v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave uporabimo tudi sredstvo **Naturalis** na osnovi entomopatogene glive *Bauveria bassiana* v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstvo na osnovi deltametrina **Decis 2,5 EC** v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Še vedno je čas za postavitev **vab za množičen ulov** in za ukrepanje **z odvrtačalnimi sredstvi**. Kot odvrtačali za oljčno muho sta za uporabo na oljki dovoljena pripravka **Invelop White Protect** na osnovi talka in **Surround WP** na osnovi kaolina, ki sta registrirana kot osnovni snovi za varstvo rastlin.

Priporočamo redno spremljanje škodljivke s pomočjo feromonskih vab ali rumenih lepljivih plošč.

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

SMS – skupen

Oljkarji

Ponekod povečana prisotnost oljne muhe -info o ulovu in ukrepih

<https://www.kmetijskizavod-ng.si/oljna-muha/>

Pripravil: Matjaž Jančar